

Causes of hospitalization at Qods Pediatric Hospital of Qazvin (2007)

A. Mahyar*

Z. Kalantari**

F. Teimouri***

F. Ebrahimpour****

*Associate Professor of Pediatrics, Metabolic Diseases Research Center, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran

**Instructor of Nursing, Faculty of Midwifery and Nursing, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran

***MS.c in Nursing, Velayat Hospital, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran

****BS.c in Nursing, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran

***Abstract**

Recognition of reasons for hospitalization of children can to great extent decrease the number of deaths through health and educational planning and preventive measures. The aim of the present descriptive study was to determine the causes of hospitalization among 0-12 Ys children referred to Qods pediatric hospital of Qazvin. Data were extracted from the medical records of 750 hospitalized children selected based on classified random sampling method during 2007. The most common groups of diseases were infectious and parasitic diseases (25.3%), respiratory diseases (20.8%), and prenatal disorders (15.2%) and the most frequent diseases were gastroenteritis (22.9%) and pneumonia (14.4%). According to our findings, conducting epidemiological studies and presenting health-educational program seem to be necessary to prevent and decrease the frequency of infectious and parasitic diseases, respiratory diseases, and prenatal disorders.

Keywords: Hospitalization, Children, Infectious Diseases

Corresponding Address: Fatemeh Teimouri, Velayat Hospital, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran

Email: ftimory@gmail.com

Tel: +98-281-3790621-5

Received: 15 May 2011

Accepted: 1 Jan 2012

بررسی علل بستری در بیمارستان کودکان قدس قزوین (۱۳۸۶)

فاطمه ابراهیم‌پور^{****}فاطمه تیموری^{***}زهرا کلاتری^{**}دکتر ابوالفضل مهیار^{*}

* دانشیار گروه کودکان مرکز تحقیقات بیماری‌های متابولیک دانشگاه علوم پزشکی قزوین

** مری و عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

*** کارشناس ارشد پرستاری بیمارستان ولایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین

**** کارشناس پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین

آدرس نویسنده مسؤول: قزوین، بیمارستان ولایت، دفتر پرستاری، تلفن ۰۲۸۱-۳۷۹۰۶۲۱-۵

Email: ftimory@gmail.com

تاریخ پذیرش: ۹۰/۱۰/۱۱

تاریخ دریافت: ۹۰/۲/۲۵

*چکیده

با شناخت علل بستری می‌توان با برنامه‌ریزی‌های بهداشتی-آموزشی و انجام اقدام‌های پیشگیرانه، از تعداد زیادی از مرگ و میرها جلوگیری کرد. این مطالعه توصیفی با هدف تعیین علل بستری در بیمارستان کودکان قدس قزوین بر روی ۷۵۰ پرونده پزشکی کودکان صفر تا ۱۲ ساله بستری در سال ۱۳۸۶ انجام شد که با نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده انتخاب شدند. بیشترین علل بستری گروه بیماری‌های عفونی و انگلی (۲۵/۳٪)، بیماری‌های تنفسی (۲۰/۸٪) و بیماری‌های مربوط به دوره پیش از تولد (۱۵/۲٪) بود. شایع‌ترین نوع بیماری گاستروآنتریت (۲۲/۹٪) و پنومونی (۱۴/۴٪) بود. لذا انجام مطالعه‌های همه‌گیر شناختی و ارایه برنامه‌های بهداشتی-آموزشی به منظور پیشگیری و کاهش بیماری‌های عفونی و انگلی، تنفسی و بیماری‌های مربوط به دوره پیش از تولد ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها: بستری در بیمارستان، کودکان، بیماری‌های عفونی

* مقدمه:

به مسؤولان کمک کند.^(۱) در مطالعه انجام شده در بیمارستان قائم مشهد، بیماری تب و تشنج شایع‌ترین علت بستری کودکان کمتر از پنج سال در آن منطقه بود.^(۲) در ایالات متحده امریکا در گروه‌های سنی ۱ تا ۴ سال و ۵ تا ۹ سال بیماری‌های سیستم تنفسی شایع‌ترین علت بستری شدن در بیمارستان بود.^(۳) با توجه به این که شناسایی الگوی بیماری‌ها می‌تواند نتایج قبل توجهی در ارتقای سلامت جامعه داشته باشد، این مطالعه به منظور تعیین علل بستری کودکان در بیمارستان قدس قزوین انجام شد.

شمار زیادی از کودکان کمتر از پنج سال هر ساله در کشورهای در حال توسعه به علت بیماری‌های تنفسی و اسهال می‌میرند که بسیاری از موارد آن با بررسی به موقع قابل پیشگیری است.^(۱) مشکلات بهداشتی و وضعیت همه‌گیر شناختی بیماری‌ها از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و عوامل مختلفی از جمله گستردگی عوامل عفونی، عوامل جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تنوع بیماری‌ها دخالت دارند. مطالعه همه‌گیر شناختی بیماری‌ها می‌تواند در شناسایی بهتر وضعیت بیماری‌های شایع و همچنین برنامه‌ریزی در رابطه با مسائل بهداشتی-آموزشی و ایجاد بخش‌های جدید بیمارستانی

جدول ۱- فراوانی کودکان بستری در بیمارستان قدس براساس گروه بیماری

درصد	تعداد	گروه بیماری
۲۵/۳	۱۹۰	عفونی و انگلی
۲۰/۸	۱۵۶	تنفسی
۱۵/۲	۱۱۴	بیماری‌های پیش از تولد
۱۴/۵	۱۰۹	نشانه‌ها و علایم آزمایشگاهی
۹/۳	۷۰	سیستم ادراری- تناسلی
۲/۸	۲۱	صدمه‌ها و مسمومیت‌ها
۲/۵	۱۹	سیستم عصبی
۲/۱	۱۶	دستگاه گوارش
۱/۷	۱۳	خونی
۱/۵	۱۱	سیستم عضلانی- اسکلتی
۱/۱	۸	ناهنجاری‌های مادرزادی
۰/۹	۷	غدد درون ریز و تغذیه
۰/۷	۵	بدخیمی‌ها
۰/۵	۴	گوش
۰/۵	۴	پوست و بافت زیرجلد
۰/۴	۳	سیستم گردش خون
۱۰۰	۷۵۰	جمع

* مواد و روش‌ها:

این مطالعه توصیفی در سال ۱۳۸۶ در بیمارستان کودکان قدس قزوین انجام شد. نمونه‌گیری به صورت تصادفی طبقه‌بندی شده بود و در مجموع ۷۵۰ پرونده از کل پرونده‌های بیماران بستری بررسی شدند. پرسشنامه شامل دو بخش مشخصات جمعیتی و مشخصات بیماری بود که با استفاده از پرونده بیماران تکمیل شد. گروه بیماری بر پایه تشخیص ثبت شده و طبقه‌بندی بیماری‌ها براساس طبقه‌بندی بین‌المللی بیماری‌ها ICD10 انجام شد، داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS16/5 و آمار توصیفی ارایه شدند.

* یافته‌ها:

اکثر بستری شدگان (۵۴/۷ درصد) مذکور بودند. ۳۰/۵ درصد از بستری‌ها در فصل تابستان، ۲۵/۹ درصد در پاییز، ۲۳/۵ درصد در بهار و ۲۰/۱ درصد در زمستان بود. ۶۸/۴ درصد بستری شدگان ساکن شهر و ۳۱/۶ درصد ساکن روستا بودند. بیشتر بستری شدگان (۸۴/۱ درصد) کودکان زیر پنج سال بودند. میانگین طول مدت بستری شدن ۴/۸±۳/۷۳ روز بود. حداقل میانگین مدت بستری مربوط به بیماری‌های پوست و بافت زیر جلد (۳±۲/۱۶) و حداقل آن مربوط به بیماری‌های سیستم گردش خون (۱۶/۳±۱۹/۰۸) روز بود. در رابطه با نوع بیماری، شایع‌ترین آن‌ها به ترتیب عبارت بودند از گاستروآنتریت (۲۲/۹ درصد)، پنومونی (۱۴/۴ درصد)، عفونت ادراری (۷/۷ درصد)، سپسیس نوزادی (۵/۹ درصد)، زردی نوزادی (۵/۲ درصد)، تب و تشنجه (۳/۱ درصد)، آسم (۲/۵ درصد)، مسمومیت دارویی (۲/۴ درصد)، برونشیولیت و تب با علت ناشناخته (۱/۹ درصد) و صرع (۱/۵ درصد). بیشترین علت بستری گروه بیماری‌های عفونی و انگلی بود (جدول شماره ۱).

*** بحث و نتیجه‌گیری:**
در این مطالعه گروه بیماری‌های عفونی و انگلی اولین علت بستری بود. در مطالعه انجام شده در برزیل بیماری‌های نوزادی و عفونی- انگلی شایع‌ترین علت بستری بوده است.^(۱) علت شیوع بالای بیماری‌های عفونی مانند گاستروآنتریت منتشریت‌های باکتریایی و ویروسی، هپاتیت و غیره می‌تواند عواملی از جمله عدم رعایت مسایل بهداشتی، تغذیه نامناسب و عدم انجام واکسیناسیون باشد.

در بین علل بستری از نظر نوع بیماری بالاترین آمار مربوط به گاستروآنتریت بود. در مطالعه هاشم‌زاده و برآک بالاترین علت بستری مربوط به بیماری تشنجه به دنبال تب بوده است.^(۲) دومین علت شایع بستری در این مرکز پنومونی بود که با نتایج مطالعه تجیب که در شیراز انجام شده است همخوانی دارد.^(۳) سومین علت بستری عفونت

* مراجع:

1. Brak M, Amini N, Abbas-gholi-zadeh N, et al. Survey causes of hospitalization in Ali-asghar children hospital in Ardabil. Ardabil University of Medical Sciences 2003; 12 (3): 18-21 [In Persian]
2. Ferrer AP, Sucupira AC, Grisi SJ. Causes of hospitalization among children ages zero to nine years old in the city of São Paulo, Brazil. Clinics (Sao Paulo) 2010; 65 (1): 35-44
3. Hashemzadeh A, Hidarian F. Etiology and symptoms of pediatric admission in the emergency and pediatric wards in Qaem hospital in Mashhad, Iran. Sabzevar University of Medical Sciences 2008; 12 (4): 42-7 [In Persian]
4. Child Health USA 2007, <http://www.mchb.hrsa.gov>. 2011 Jan 9
5. Najib KH, Fallahzadeh E, Fallahzadeh M. Disease spectrum and mortality in hospitalized children of southern Iran. Iran J Pediatr 2007; 17 (3): 359-63 [In Persian]
6. Molineh D, Shimelis D, Benti D. Analysis of admission to the pediatric emergency ward of Tikur Anbessa hospital in Addis ababa, Ethiopia. Ethiop J Health 2007; 21 (1): 48-5

ادراری بود در حالی که در مطالعه هاشم زاده در مشهد برونشیویت سومین علت بستری شدن در بیمارستان بوده است.^(۳)

در این مطالعه تعداد بستری شدگان در جنس مذکر بیشتر از جنس مؤنث بود که در مطالعه نجیب و مولونه نیز جامعه بستری شدگان مذکر بیش از مؤنث بوده است.^(۴)

بیشتر بستری شدگان در گروه سنی شیرخوارگی بودند که نشان می‌دهد این گروه سنی در معرض ابتلاء به انواع بیماری‌ها هستند و به مراقبت بیشتری نیاز دارند. این نتیجه با اکثر مطالعه‌های انجام شده همخوانی دارد.^(۵-۶) به طور کلی با توجه به شیوع زیاد بیماری‌هایی چون گاستروآنتریت، پنومونی و عفونت ادراری در بین علل بستری در این منطقه، به نظر می‌رسد مطالعه‌های همه‌گیر شناختی و ارایه برنامه‌های بهداشتی به منظور پیشگیری از این بیماری‌ها ضروری باشد.